SELBST VERSTÄNDLICH IMPFEN

Die Impfungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen.
Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll.
Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den
Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.

Der Impfkalender ist nun in den Sprachen Albanisch, Arabisch, Bulgarisch, Dari, Deutsch, Englisch, Farsi, Französisch, Kroatisch, Kurdisch, Pashto, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Tigrinya, Türkisch, Urdu und Vietnamesisch kostenlos als Download verfügbar.

IMPFKALENDER

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), 2017/18. www.stiko.de

	(in Wochen)		glinge (in Monaten)		Kleinkinder		Kinder		(in Jahren)	Jugendliche		Erwachsene	
ALTER	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	ab 18	ab 60
IMPFUNG			U4		U6	U7	U7A/8	U9	U10	Л			
Tetanus		G1	G2	G3	G4	· N		ΑΊ	N·	A	2	A (f) (alle 10 Jahre, ggf. N)	
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N		ΑΊ	N	A	2	A f (alle 10 Jahre, ggf. N)	
Keuchhusten Pertussis		G1	G2	G3	G4	Ň		ΑΊ	N .	A	2	A (ggf. N)	
Kinderlähmung Poliomyelitis		G1	G2 @	G3	G4	N	<u> </u>			A	1	ggf	N .
Hepatitis B		G1	G2 @	G3	G4	. N							
Hib Haemophilus influenzae Typ b		G1	G2 @	G3	G4	N.			•••••			4	
Pneumokokken (9		G1		G2	G3	N.							S (
Rotaviren	G1 b	G2	(C3)										
Meningokokken Serogruppe C					(ab 12 N	i 1 Ionaten)	. N						
Masern					G1	G2	. N					S d	
Mumps Röteln					G1	G2	N'						
Windpocken Varizellen					G1	G2	Ņ.						
Grippe Influenza													S (jährlich
HPV Humane Papillomviren										G1 G2 e e	N e		

ERLÄUTERUNGEN



GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 4 Teilimpfungen G1 – G4)
STANDARDIMPFUNG

AUFFRISCHIMPFUNG

NACHHOLIMPFUNG (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie) Früherkennungsuntersuchung

Früherkennungsuntersuchung Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12–14 Jahren)

- Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
- Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
 Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff, Auffrischimpfung nur für bestimmte Indikationen ampfablen.
- d Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. Vorzugsweise mit einem MMR-Impfstoff.
- © Standardimpfung für Mädchen im Alter von 9 bis 14 Jahren. Für Nachhol-
- impfungen und Anzahl der Impfstoffdosen Fachinformation beachten.

 f Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.
- Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Dosen.

ROBERT KOCH INSTITUT

In weiteren 19 Sprachen unter www.rki.de/impfkalender erhältlich!

Gefördert durch:

Bundesministerium für Gesundheit